

ЛИПОТЕН (LIPOTENE)

СТЕРИЛЬНЫЙ СОСТАВ, ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КЛЕТОЧНУЮ СТЕНКУ В ЖИРОВЫХ КЛЕТКАХ, ПОРАЖЕННЫХ ФИБРОСКЛЕРОЗОМ. МЕНЕЕ БОЛЕЗНЕННЫЙ, ПО СРАВНЕНИЮ С ЛИПОЛИЗОМ, ОТЕК ВЫРАЖЕН МЕНЬШЕ, УСИЛЕН ЛИПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:

РАСТВОРЯЕТ ЖИРОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ И ИЗЛИШКИ ЖИРА, УВЕЛИЧИВАЕТ ПРИТОК КРОВИ К ОБРАБОТАННОЙ ОБЛАСТИ, РАЗРУШАЕТ ФИБРОЗНЫЕ БУГОРКИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ, СПОСОБСТВУЕТ УСИЛЕНИЮ ДРЕНАЖНОЙ ФУНКЦИИ ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

МЕТОД ВВЕДЕНИЯ:

ДОЗА НЕ МЕНЕЕ 5 МЛ ЗА 1 ПРОЦЕДУРУ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ

ОБКАЛЫВАЕМАЯ ЗОНА УСЛОВНО РАЗБИВАЕТСЯ НА КВАДРАТЫ 5 СМ * 5 СМ, В «УГЛЫ» КВАДРАТА ВВОДИТСЯ ПРЕПАРАТ. В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПЛОЩАДЬ КВАДРАТА МОЖЕТ БЫТЬ УМЕНЬШЕНА ДО 3 СМ*3 СМ (2,5СМ*2,5 СМ)

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОЦЕДУР – 1 РАЗ В ТЕЧЕНИИ 10-15 ДНЕЙ.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛИПОТЕНА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В 2-3 РАЗА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДА *ИНТРАЛИПОТЕРАПИИ*. МЕТОД ОСНОВАН НА ВВЕДЕНИИ ПРЕПАРАТА ЛОКАЛЬНО В ПРОБЛЕМНЫЕ.

ЗОНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ЛЕЧЕНИЮ ЛИПОТЕНОМ:

БЕДРА, ЯГОДИЦЫ, ЖИВОТ, ЖИРОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ТАЛИИ И СПИНЫ, ЖИРОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗАТЫЛКА, ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ПЛЕЧА.

ОБЪЕМ: 5,0 МЛ ВО ФЛАКОНЕ.