

# ПЛАЦЕНТЕКС ИНТЕГРО (PLACENTEX INTEGRO)

**ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ:** ПРЕПАРАТ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРИ ДИСТРОФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ.

**ФАРМАКОДИНАМИКА:** АКТИВНЫМ ДЕЙСТВУЮЩИМ КОМПОНЕНТОМ ПРЕПАРАТА ЯВЛЯЕТСЯ КОМПЛЕКС PDRN-ПОЛИДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕОТИД-НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ, КОТОРЫЙ ПОЛУЧЕН ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЯДА СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЛАБОРАТОРИИ «МАСТЕЛЛИ»

**ФАРМАКОКИНЕТИКА:** АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРЕПАРАТА, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ СПЕЦИФИЧЕСКИМИ, УЧАСТВУЮТ В МЕТАБОЛИЗМЕ ПОЛИДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕОТИДОВ ЭНДРОГЕННОГО И ЭКЗОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.

**ПРАВИЛА НАЗНАЧЕНИЯ:** ПРИ ВНУТРЕМЫШЕЧНОМ И ПОДКОЖНОМ ВВЕДЕНИИ ПРЕПАРАТА – 1 АМПУЛА ЧЕРЕЗ ДЕНЬ, КУРСОМ 15-20 ДНЕЙ. ПРИ ЛОКАЛЬНОМ ВВЕДЕНИИ – 1 АМПУЛА НА 1 ПРОЦЕДУРУ, 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ, КУРС 5-7 ПРОЦЕДУР.

**ТОКСИКОЛОГИЯ:** В РЕЗУЛЬТАТЕ ОПЫТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ, ПРОВОДИМЫХ НА КРЫСАХ И МЫШАХ, НЕ ОПРЕДЕЛЕНА ТОКСИЧНАЯ ДОЗИРОВКА ПРЕПАРАТА.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ ПРЕПАРАТА. ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ПРЕПАРАТУ НЕОБХОДИМО ПРЕКРАТИТЬ ВВЕДЕНИЕ И, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ НАЧАТЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРУЮЩУЮ ТЕРАПИЮ

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** ХРАНИТЬ ПРЕПАРАТ ВДАЛИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА И БЕРЕЧЬ ОТ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА.