

ЙОХИМБИНА (YOHIMBINA)

ДЕЙСТВИЕ:

БЛОКИРУЕТ АЛЬФА-2-АДРЕНЕРГИКО КОРотКОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ (СУЩЕСТВУЮЩИЕ НЕДОЛГО). АНЕСТЕЗИЯ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ НЕРВНЫХ ОКОНЧАНИЙ. АНТИДИУРЕТИК, УЛУЧШАЕТ ОРТОСТАТИЧЕСКУЮ ГИПОТАНИЮ. УВЕЛИЧИВАЕТ В СЕРДЦЕ ОБЪЕМ КРОВИ И КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ. УМЕНЬШАЕТ КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ ИЗ-ЗА РАСШИРЕНИЯ СОСУДОВ. СТИМУЛИРУЕТ ПОЛОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ СТРИХНИН, КОТОРЫЙ УВЕЛИЧИВАЕТ ВСЕ РЕФЛЕКСЫ, ТОГДА КАК ЙОХИМБИНА ТОЛЬКО РЕФЛЕКСЫ ТАЗОВОЙ ОБЛАСТИ.

ПРИМЕНЕНИЕ:

ПРИЕМ ЧЕРЕЗ РОТ ИЛИ ГИПОДЕРМИЧЕСКИМ ПУТЕМ, КАК СЕКСУАЛЬНЫЙ СТИМУЛЯНТ ПРИ ИМПОТЕНЦИИ.

ПРИ БОЛЕЗНЕННЫХ МЕНСТРУАЦИЯХ СО СКУДНЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ, АМЕНОРЕЯ И Т.Д.

НАРУЖНО ПРИМЕНЯЕТСЯ КАК МЕСТНЫЙ АНЕСТЕТИК В ОФТАЛЬМОЛОГИИ, ПРИ МАЛЕНЬКИХ ПАЛЬПИРУЕМЫХ ОПЕРАЦИЯХ, ПРИ РОГОВИЧНЫХ ОПЕРАЦИЯХ, УШНЫХ И НА НОСУ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИПОДЕРМИЧЕСКОГО ПУТИ ИЛИ I.M. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИ ПРОСТАТИТЕ С БОЛЯМИ (ИЛИ НЕУДОБСТВОМ) В МОЧЕВОМ ПУЗЫРЕ И ПРИ ОБИЛЬНОМ МОЧЕИСПУСКАНИИ.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

ПЕЧЕНОЧНАЯ И ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ.

ФОРМАТ:

АМПУЛЫ 0,2% - 5МЛ.